

新竹市北區加強腸病毒防治查核表

學校名稱：**北衛幼兒園**

檢查日期：**106/01/01**

抽 查 項 目	查核情形	現場處理 及建議	備註
洗手 環境 與 行為	(1) 是否於洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙	V	
	(2) 是否衛教學童瞭解正確洗手步驟	V	
	(3) 學童洗手動作是否正確	V	
	(4) 學童是否認知正確洗手時機	V	
環 境 清 消	(1) 是否能正確配製 500ppm 漂白水	V	
	(2) 是否定期環境清潔及重點消毒	V	
	(3) 是否製作清消紀錄	V	
防 疫 機 制	(1) 是否建立學童健康監視記錄 (點名簿)	V	
	(2) 是否瞭解停課通報機制運作	V	
	(3) 是否知道如何查詢宣導資料	V	
	(4) 是否張貼宣導資料	V	
	(5) 是否實施家長衛教	V	

備註：1. 均符合規定者為合格，不合格之學校應要求立即改進，並再予複查。

2. 正確洗手時機：回到家後、吃東西前、上完廁所後、玩遊戲後；正確執行洗手步驟：濕、搓、沖、捧、擦)

負責人簽章：**王小明**

查核人員：**吳大明**

e-mail：**72301@ems.hccg.gov.tw**

電話：**03-5353969**

傳真：**03-5324077**

腸病毒感染併發重症前兆病徵自我檢查表

親愛的家長：

大多數人在感染腸病毒後，約 7 至 10 天即能痊癒，但是有極少數的人感染腸病毒後，會出現嚴重併發症，如腦炎、腦膜炎、急性肢體麻痺症候群...等。另外，根據研究資料顯示，若家中有第二個幼兒感染腸病毒時，要特別小心注意其病情的發展，因為第二個病患所接受的腸病毒之病毒量往往較高，其嚴重程度可能提高。

目前國內對於腸病毒感染併發重症已有很好的治療方式，因此，若家中幼兒感染腸病毒時，自症狀開始後 7 天內要特別注意觀察病童是否出現腸病毒重症前兆病徵(如下表所列者)，並迅速送往大型醫院就醫，以掌握治療黃金時間，避免小孩病情惡化。

腸病毒感染併發重症前兆病徵	有	無
嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力 除了一直想睡外，病童顯得意識模糊、眼神呆滯或疲倦無力，原來活潑的小孩會變得安靜不想動，但發燒本身就會影響小孩活力，所以上述症狀的判斷應以體溫正常時的精神活力為準。		V
肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮） 通常是在睡眠中時出現被驚嚇或突然間全身肌肉收縮，隨著病情變化嚴重時，在清醒時也會出現。另外，病童可能因肌抽躍症狀而變得無法入眠。		V
持續嘔吐 嘔吐可為腦壓上升的症狀表現之一，嘔吐次數愈多愈欲要注意，尤其是伴隨嗜睡、活力下降，或只有嘔吐而無腹痛、腹瀉等腸胃炎症狀時，需要特別注意。		V
呼吸急促或心跳加快 小孩安靜且體溫正常時，心跳每分鐘 120 次以上。		V

若您想知道更多腸病毒的資訊，可至疾病管制局網站查詢，網址：<http://www.cdc.gov.tw>，進入「防疫專區/疾病介紹/第三類傳染病－腸病毒感染併發重症」，或多利用該局民眾疫情通報及諮詢服務專線：1922，也可就近洽詢所在地衛生局。